

【根菜類】

No.	作物名	散布方法	希釈倍率	散布量	散布時期・回数		備考
1	ゴボウ	追肥	200～300倍	300～400ℓ/10a	1回目	6葉展開期	
					2回目	根茎肥大開始期	
					3回目	上記2回目から2～3週間後	
2	ショウガ	追肥	200倍	200ℓ/10a	1回目	第1茎の7葉展開期	『ライフイン』は水溶性カルシウムを7.0%含有。カルシウム欠の心配はなくなり、且つ植生が欲するタイミングで補給可能。
					2回目以降	上記1回目から10日～14日間隔	
3	ダイコン	追肥	200～300倍	200～300ℓ/10a	1回目	6葉展開期	
					2回目	根茎肥大開始期	
					3回目	上記2回目から2～3週間後	
4	ニンジン	追肥	200～300倍	200～300ℓ/10a	1回目	6葉展開期	
					2回目	根茎肥大開始期	
					3回目	上記2回目から2～3週間後	

注1)一回あたりの**原液正味投入量を2kg/10a**にするのが理想的。散布量は作業上困難であれば散布設備に合わせて変更。

注2)上記は標準施用時期及び量であり、生育によってはこの限りでなく、チッ素肥効への偏りがみられる時には、更に追肥する。

注3)降雨の続く時にもライフインの施用は軟弱徒長を防ぎ、健全な生育に有効である。

注4)苦土の要求量が増えるため、りん酸吸収効率の上昇効果を含めて腐植酸苦土肥料の施肥を推奨。

<ご注文・お問い合わせ先>

有限会社サンジェットアイ
 岡山県倉敷市玉島八島1987
 TEL 086-523-5420 FAX 086-523-5450
<http://www.sunjet-eye.co.jp>