

【葉菜類】

No.	作物名	散布方法	希釈倍率	散布量	散布時期・回数		備考
1	キャベツ	追肥	400倍	300ℓ/10a	1回目	4葉展開期	
					2回目	6葉展開期	
					3回目	結球前	
2	ハクサイ	育苗	400倍	3ℓ/㎡	1回目	定植時に4葉以上展開している場合	
		追肥	400倍	300ℓ/10a	1回目	結球葉が立上る前	
					2回目	上記1回目から2～3週間後	
3	ハウレンソウ	追肥	400倍	500～800ℓ/10a	1回目	4葉展開期	400倍希釈厳守。
					2回目	6葉展開期	
					3回目	収穫3週間前	
4	レタス	育苗	400倍	3ℓ/㎡	1回目	定植時に4葉以上展開している場合	
		追肥	400倍	300ℓ/10a	1回目	4葉展開期	
					2回目	6葉展開期	
					3回目	結球前	

注1) 一回あたりの**原液正味投入量を2kg/10a**にするのが理想的。散布量は作業上困難であれば散布設備に合わせて変更。

注2) 上記は標準施用時期及び量であり、生育によってはこの限りでなく、チッ素肥効への偏りがみられる時には、更に追肥する。

注3) 降雨の続く時にもライフインの施用は軟弱徒長を防ぎ、健全な生育に有効である。

注4) 苦土の要求量が上がるため、りん酸吸収効率の上昇効果を含めて腐植酸苦土肥料の施肥を推奨。

<ご注文・お問い合わせ先>

有限会社サンジェットアイ
 岡山県倉敷市玉島八島1987
 TEL 086-523-5420 FAX 086-523-5450
<http://www.sunjet-eye.co.jp>