

【イモ類】

No.	作物名	散布方法	希釈倍率	散布量	散布時期・回数		備考
1	サツマイモ	育苗	200倍	3ℓ/m ²	1回目	定植20日前	
					2回目	定植10日前	
		追肥	200倍	400ℓ/10a	1回目	根茎肥大開始期2週間前	
					2回目以降	上記1回目から2～3週間毎、収穫2週間前迄	
					その他	※高温・多雨の「つるボケ」がでそうな時。	
2	ナガイモ	追肥	200～300倍	300～400ℓ/10a	1回目	6葉展開期	
					2回目	根茎肥大開始期	
					3回目	上記2回目から2～3週間後	
3	バレイショ	追肥	200倍	200ℓ/10a	1回目	出芽後、着蕾期までの間	
					2回目	着蕾期	
					3回目以降	上記2回目から2～3週間毎に1回以上	

注1) 一回あたりの原液正味投入量を2kg/10aにするのが理想的。散布量は作業上困難であれば散布設備に合わせて変更。

注2) 上記は標準施用時期及び量であり、生育によってはこの限りでなく、チッ素肥効への偏りがみられる時には、更に追肥する。

注3) 降雨の続く時にもライフインの施用は軟弱徒長を防ぎ、健全な生育に有効である。

注4) 苦土の要求量が増えるため、りん酸吸収効率の上昇効果を含めて腐植酸苦土肥料の施肥を推奨。

<ご注文・お問い合わせ先>

有限会社サンジェットアイ
 岡山県倉敷市玉島八島1987
 TEL 086-523-5420 FAX 086-523-5450
<http://www.sunjet-eye.co.jp>